

¿Qué debo hacer en caso de emergencia o sobredosis?

En caso de sobredosis, llame al centro local de envenenamiento al 1-800-122-1222.

Si la persona que está tomando el medicamento sufre un colapso o no respira respirando, llame al servicio de emergencia local al 911.

¿Qué otra información adicional necesito saber sobre Truvada?

- No permita que otra persona tome su medicamento.
- Si tiene alguna pregunta respecto a cómo volver a surtir la receta, hable con su farmacéuta.
- Haga una lista de todas sus recetas médicas y medicamentos de venta libre, así como de cualquier vitamina, mineral u otro suplemento dietético que esté tomando.
- Traiga la lista de medicamentos cada vez que consulte con el médico o en caso de internación hospitalaria.
- Tenga la lista de medicamentos con usted, en caso de una emergencia.

¿Qué debo hacer si dejo de tomar el medicamento?

Si por alguna razón, deja de tomar Truvada, informe a su coordinador de PrEP en el centro de salud.

IMPORTANTE

La protección contra la infección por VIH comenzará a desaparecer entre 7 y 10 días después de dejar PrEP.

Utilice métodos alternativos de prevención para reducir su riesgo de contagiarse de VIH.

Los pacientes diagnosticados con hepatitis B deben controlarse de manera muy exhaustiva al dejar PrEP.



DEPARTAMENTOS DE SALUD DE LOS CONDADOS DE GWINNETT, ROCKDALE Y NEWTON PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL VIH

455 Grayson Hwy, Suite 500
Lawrenceville, GA 30056

Phillys Mwaura

Teléfono principal 770-339-4283 Ext. 420
Teléfono celular 770-633-5069
Fax 770-339-2345
phillys.mwaura@gnrhealth.com



www.gnrhealth.com



@GNRHD



@GNRHealth

20201229

PREVENCIÓN DEL VIH

PrEP

Sólo una pastilla al día.



Truvada®

emtricitabine-tenofovir disoproxil fumarate

200 mg emtricitabina - 300 mg fumarato de tenofovir desoprixila

Este es un paso importante para protegerse contra el VIH adquirido.

EL MEDICAMENTO QUE ESTARÁ TOMANDO PARA PREP ES:

MARCA

Truvada

Se pronuncia tru VA da

NOMBRE GENÉRICO

**FUMARATO DE TENOFOVIR
DESOPROXILA Y EMTRICITABINA**



PREGUNTAS MÁS COMUNES

¿Qué es Truvada (PrEP)?

Truvada es un medicamento que se utiliza para prevenir la infección por VIH.

Los médicos se refieren al uso de Truvada para prevenir la infección por VIH como profilaxis previa a la exposición o PrEP.

¿Cómo actúa Truvada para prevenir la infección por VIH?

El VIH es un virus que ataca a las células inmunes del organismo, es decir, las células responsables de combatir una infección.

Los dos compuestos que conforman el Truvada, el tenofovir y la emtricitabina bloquean rutas importantes que los virus establecen al momento de la infección.

Los niveles de protección de Truvada PrEP tardan siete días en desarrollarse en el tejido anal y rectal.

Se requieren 21 días para lograr niveles de protección en la vagina y la sangre.

Una vez que ha tomado Truvada durante el tiempo necesario para lograr la protección, debe continuar tomándolo diariamente, en lo posible, a la misma hora todos los días, a fin de que continúe la protección contra la infección por VIH.

¿Cómo debo tomar el medicamento?

- Tome un comprimido de Truvada por vía oral todos los días.
- Siga detalladamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase y ante cualquier duda, consulte con su médico o farmacéuta.
- Cuando se esté acabando el medicamento, comuníquese con su médico o farmacéuta para volver a surtir la receta.

No deje de tomar Truvada sin antes consultar con su médico.

El riesgo de infección por VIH puede aumentar en caso de omitir una dosis o dejar de tomar Truvada todos los días.

¿Debo seguir una dieta especial mientras esté en PrEP?

Continúe con su dieta normal, salvo que su médico le indique lo contrario.

¿Qué debo hacer si olvidé tomar una dosis?

Si olvidó tomar una dosis de Truvada, tome la dosis tan pronto pueda. Sin embargo, si ya es casi el momento de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y continúe con el programa normal de dosis.

No tome una dosis doble de Truvada para compensar la dosis olvidada.

¿Este medicamento tiene efectos secundarios?

Es posible que experimente ciertos efectos secundarios mientras esté tomando Truvada.

Normalmente, los efectos secundarios desaparecen durante el primer mes que esté tomando el medicamento.

Los efectos secundarios más comunes incluyen:

- malestar estomacal
- dolor de cabeza
- vómitos
- pérdida de apetito

Avisé a su médico si alguno de estos síntomas es grave o no desaparece.

Llame al médico de inmediato si tiene algún problema poco usual al tomar el medicamento o si tiene fiebre o escalofríos, especialmente, si están acompañados de dolor de garganta, tos, sarpullido u otros signos de infección.

¿Cómo debo almacenar mi medicamento?

- Truvada debe guardarse en el envase original, firmemente cerrado y fuera del alcance de los niños.
- Guarde Truvada a temperatura ambiente y manténgalo alejado del calor excesivo y la humedad.

Desheche cualquier medicamento que esté vencido o que no se esté usando. Pregúntele al farmacéuta cómo debe desechar el medicamento.